

FAQ : vaccination contre la Covid-19

1) Pourquoi poursuivre la campagne de vaccination puisque 70% de la population est maintenant vaccinée ?

La Belgique se place en effet au haut du classement de la vaccination de la population. Plusieurs objectifs ont été atteints¹ :

- 71 % de la population belge est totalement vaccinée ;
- 92% des plus de 65 ans sont entièrement vaccinés ;
- 85 % de la population âgée de +18 ans est entièrement vaccinée.

Néanmoins, la situation diffère fortement d'une région à l'autre. A Bruxelles en particulier, la situation est préoccupante :

- 49,3% de la population bruxelloise est totalement vaccinée ;
- 80% des plus de 65 ans sont entièrement vaccinés ;
- 62% de la population âgée de +de 18 ans est entièrement vaccinée.

L'objectif de 70% avait été défini par les experts sur base du taux de reproduction de la souche initiale du virus. Or, le variant Delta est beaucoup plus contagieux. Un pourcentage plus élevé de la population doit donc être immunisé pour empêcher sa propagation et éviter la saturation des hôpitaux ainsi qu'une surmortalité excessive. **La Task Force Vaccination mise désormais sur un taux de vaccination de 80% pour atteindre l'immunité collective, mais ce chiffre est peut-être encore sous-évalué. Certains experts estiment aujourd'hui à 90% le taux d'immunité à atteindre.**

Par ailleurs, il faut une distribution homogène des personnes vaccinées. La vaccination sera moins efficace si des différences régionales et sanitaires aussi importantes subsistent.

2) Le vaccin reste-t-il efficace malgré le variant Delta?

Tout d'abord, **aucun vaccin n'est efficace à 100%**. Il est toujours possible d'être contaminé ou d'être malade du Covid-19 en étant vacciné. C'est également le cas avec les autres vaccins (grippe, méningite, hépatite B, etc.).

On remet parfois en question l'efficacité des 4 vaccins contre le variant Delta (Pfizer, AstraZeneca, Moderna et Johnson & Johnson). **Néanmoins, il est important de souligner que les vaccins restent efficaces à plus de 65% minimum (de 67% à 85% selon les vaccins).** Ces 4 vaccins ont pu démontrer qu'ils conservaient une efficacité contre le variant Delta, principalement contre les formes graves de la maladie, les hospitalisations et les décès.

Par ailleurs, une récente étude de Sciensano démontre que le risque de contamination chute de 90% entre une personne positive mais vaccinée et son contact à haut risque vacciné. **En d'autres termes, le risque de contamination chute de 80 à 90% entre personnes vaccinées.**

¹ SCIENSANO, Covid-19 _ Bulletin épidémiologique du 4 septembre 2021, p.11

3) Quelle est la proportion de patients « covid » vaccinés dans les hôpitaux et USI (Unité de Soins Intensifs) ?

Les chiffres communiqués par voie de presse (« **seuls 2% des patients Covid étaient totalement vaccinés** » vs « **1/3 des patients covid étaient vaccinés** ») ne sont pas fiables car ils :

- reposent sur des estimations formulées par Sciensano sur base de groupe de patients (et non sur une analyse détaillée) ;
- ne tiennent pas compte de l'évolution de la vaccination (les estimations ont été réalisées de janvier à juillet – Or en janvier, quasiment personne n'était vacciné et le nombre de personnes vaccinées hospitalisées était forcément très faible) ;
- incluent tous les cas positifs au Covid, même lorsque le virus n'est pas la cause de l'hospitalisation. Vu qu'il est obligatoire de réaliser un test PCR avant d'être hospitalisé, il apparaît que la moitié des tests positifs seraient observés chez des patients hospitalisés pour une autre raison (et qui sont donc, dans la plupart des cas, asymptomatiques).

Aujourd'hui, l'information sur le statut vaccinal des patients Covid hospitalisés n'est en fait pas « officiellement » récoltée par les hôpitaux. Le nombre de patients totalement vaccinés hospitalisés à cause du Covid n'est donc pas connu. **Le MR regrette l'absence de statistiques fiables en la matière.**

Néanmoins, sur le terrain, **les responsables hospitaliers constatent que la grande majorité des personnes hospitalisées pour la covid n'a pas été vaccinée.**

4) Pourquoi se faire vacciner puisque la vaccination n'empêche pas la contamination ?

Nous encourageons chacun à se faire vacciner car :

- **La transmission du virus est diminuée d'un ordre de grandeur de 80 à 90% grâce à la vaccination ;**
- **La vaccination réduit significativement les probabilités de développer une forme sévère du Covid.** Même contaminées, les personnes vaccinées ont 30 fois moins de risque d'être hospitalisée que les non-vaccinés (selon de nouvelles données des Centre de lutte et de prévention des maladies aux Etats-Unis) ;
- Si les chiffres peuvent légèrement varier d'une étude à l'autre, **les personnes vaccinées sont entre 3 fois et 5 fois moins susceptibles d'être contaminées ;**
- **La vaccination permet aussi de protéger les personnes qui ne peuvent pas être vaccinées** (personnes souffrant de graves maladies, par exemple) **ou dont le système immunitaire est trop affaibli** pour que la protection du vaccin soit pleinement efficace, dont les personnes âgées et immunodéprimées.

Se faire vacciner, c'est se protéger soi mais aussi protéger ceux qui nous entourent, en particulier les personnes plus vulnérables. Plus une collectivité compte de personnes vaccinées, plus elle prévient les risques d'épidémies.

5) Certains rapports étrangers font état de décès liés à l'injection d'un vaccin anti-covid. Les vaccins anti-covid peuvent-ils entraîner la mort ?

Certaines études font état d'une augmentation significative de la mortalité vaccinale des vaccins Covid. Certains graphiques et tableaux font même état de milliers de morts aux Etats-Unis suite aux vaccins anti-covid.

Ces chiffres sont à relativiser. Les décès après un vaccin anti-covid sont rares. Plus de 369 millions de vaccins anti-covid ont été administrés aux Etats-Unis entre le 14 décembre 2020 et le 30 août 2021.

Pendant cette période, VAERS² (Vaccine Adverse Event Reporting System) a reçu la confirmation de 7.218 décès de personnes vaccinées contre la Covid. Le lien entre la vaccination et les décès n'est cependant pas établi. Les déclarations d'événements indésirables au VAERS après une vaccination, y compris les décès, ne signifient pas nécessairement que le vaccin a causé un problème de santé.

En Belgique, au 10 août 2021, sur les 8.191.161 personnes qui ont reçu au moins 1 dose d'un vaccin contre la Covid-19, 26.630 rapports d'effets indésirables ont été notifiés. Parmi ceux-ci, 6.788 signalements ont été classifiés comme graves par l'AFMPS en raison d'une incapacité de travail temporaire ou de l'impossibilité de quitter la maison.

En Belgique toujours, 200 notifications concernent des décès **(0,00002%)**. Néanmoins, après évaluation et prise en considération des troubles cliniques antérieurs à la vaccination, et de l'évolution naturelle de ces conditions préexistantes, **seuls quatre décès sont considérés comme « probablement liés au vaccin »**.

² [Selected Adverse Events Reported after COVID-19 Vaccination | CDC](#)